MALADIES INFLAMMATOIRES

Quand doit-on se préoccuper du risque vasculaire?

André Roussin MD, FRCP
CHUM et ICM
Professeur agrégé
Université de Montréal

- ◆ Risques cardio-vasculaires
 - Maladies rhumatologiques
 - Maladies digestives
- ◆ Impact des maladies inflammatoires
 - Sur l'incidence des désordres CV
- ◆ Impact des Tx de nouvelle génération
 - Et maîtrise des facteurs de risques CV

Inflammation et risque cardio-vasculaire

Conflits d'intérêts potentiels 2015 – 2017

Pour cette présentation

Comités aviseurs ou aviseur expert:

Aucun

Fonds de recherche:

Aucun

Conférencier:

Aucun

Prévention primaire

Cas clinique d'une arthrite psoriasique

- ◆ **Patiente de 50 ans, grande sportive, connue pour arthrite psoriasique ne répondant pas au methotrexate, mise sous Etanercept. Pas de stéroïdes POS**
- ◆ **Traitée aussi pour HTA avec irbesartan 300 mg**
- ◆ **HbA1c 0.5, HDL-C 1.8, LDL-C 3.5**
- ◆ **Inquiète car père fumeur IM 45 ans dcd 70 ans et soeur rectite Crohn ASO périphérique 50 ans dcd 62 ans cancer poumon**

◆ **Est-ce que son risque CV est élevé?**

◆ **Que suggérer?**

Prévention primaire

Cas clinique d'une colite ulcéreuse

- ◆ **Patiente de 50 ans, CU, connue pour EP à 25 ans**
 - ◆ **Contrôlée avec mesalamine. A cessé l'anticoagulation.**
 - ◆ **Aucun facteur de risque CV**
 - ◆ **Inquiète car a lu que les maladies inflammatoires augmentent le risque d'infarctus**
-
- ◆ **Est-ce que son risque CV est élevé?**
 - ◆ **Que suggérer?**

Maladies rhumatologiques

Manifestations cardio-vasculaires multiples

Athérogénèse humaine: pathologie et clinique

De l'intima-media à la plaque/sténose/rupture/thrombose

Marqueurs inflammatoires selon stade ASO

1° & Messenger Inflamm.
Cyto/Chemokines

IL-1
TNF- α
IL-6*
IL-18*
MCP-1*

Cellular Adhesion
Molecules

sICAM
sVCAM
sSelectins

Plaque
Destabilization

IL-18*
oxLDL*
Lp-PLA₂*
GPx-1*
MPO*
MMPs*
MCP-1*
PIGF*

Plaque
Rupture

PAPP-A*
sCD40L*

Acute Phase Reactants
CRP*, sPLA₂*, SAA, Fibrinogen, WBCC

Inflammasome NLRP3 et ASO

Du LDL-C
oxydé ou
cristaux de
cholestérol à
IL-1 β et IL-18

Guo H et al. Nature
Medicine 2015; 21:
677-87

Inflammasome selon l'évolution de l'ASO

Inflammation: schéma ultra simplifié

Adapté et simplifié de Libby P et al.
Circulation. 1999;100:1148–1150.

Cascade physiopathologique: synopsis

Facteurs déclenchants

Tabac, Diabète, LDL/LDL-ox, HTA, AgII, Stress cisaillement

Facteurs endothéliaux

Facteurs inflammatoires

Signalisation intra-inter-cell., actions protéiques/enzymatiques

Facteurs pro-coagulants

TF, PAI-1 / tPA, TxA₂ / Perturbation prostacyclines

Inflammation: médicaments et sites d'intervention

Ridker PM Luscher TF. EHJ 2014; 35: 1782-91

PAR et ASO

Physiopathologie partagée

Rheumatoid arthritis

Atherosclerosis

TNF- α
Endothelin
Autoantibodies
(e.g. oxLDL)
Metalloproteinases
T-cell activation
Macrophage
activation
Adhesion
molecules
(e.g. VCAM-1)
IL-6

Arthrite rhumatoïde

Conséquences cardio-vasculaires

- ◆ MCAS: principale cause de mortalité
- ◆ Risque IM X 2 (EULAR 2016: RISQUE CV global X 1.5)
- ◆ Mortalité après IM plus élevé que sans AR
- ◆ Score de Framingham sous-estime le risque CV
- ◆ LDL-C ↑ et HDL-C ↓
- ◆ **Risque CV semblable au diabète**
- ◆ Rôle de l'échographie carotidienne (EULAR 2016) et du score calcique

PAR et manifestations cardio-vasculaires

Après ajustement pour autres causes de mortalité

PR, événements cardiovasculaires et médicaments – Lesquels maximiser et lesquels proscrire

RR (95% CI)	Tous CVEs	IDM	Ins.card.	AVC	MACES
Anti-TNF alpha	0.70 (0.54 – 0.90) 16	0.59 (0.36 – 0.97) 6	0.75 (0.49 – 1.15) 7	0.57 (0.35 – 0.92) 6	0.30 (0.15 – 0.57) 4
MTX	0.72 (0.57 – 0.91) 8	0.81 (0.68 – 0.96) 3	0.80 (0.60 – 1.00) 1	0.78 (0.40 – 1.50) 1	0.38 (0.05 – 2.84) 2
AINS (tous)	1.18 (1.01 – 1.38) 8	1.13 (0.93 – 1.37) 3	0.86 (0.71 – 1.03) 1	2.15 (1.19 – 3.87) 2	1.56 (0.82 – 2.97) 2
AINS non-sélectifs	1.08 (0.94 – 1.24) 4				
Célécoxib	1.03 (0.80 – 1.32) 5				
Rofécoxib	1.58 (1.24-2.00) 6				
Glucocorticoïdes	1.47 (1.34 – 1.60) 11	1.41 (1.22 – 1.63) 3	1.42 (1.10 – 1.82) 1	1.57 (1.05 – 2.35) 2	1.62 (1.22 – 2.16) 4

Lupus érythémateux disséminé

Conséquences cardio-vasculaires

- ◆ Cause importante de morb./mort.
- ◆ Jeunes femmes lupiques: risque IM X 2, IC X 4, AVC X 2*
- ◆ Mort. cardiaque 1^{ère} cause mort. pour LED chronique
- ◆ ASO prématurée indépendante des autres Fct. risque
- ◆ Âge, durée maladie et immunosuppression: ASO
- ◆ ANA pourraient contribuer en plus de l'inflammation

*Ward MW. Arthritis & Rheumatism 1999; 42: 338-46

Arthrite psoriasique

Conséquences cardio-vasculaires

- ◆ Risque IM X 2.6
- ◆ Risque angor X 2
- ◆ Intima-media augmentée*
- ◆ Le score de Framingham ne reflète pas l'ASO*
- ◆ **Facteurs aggravants:** diabète, hyperlipémie (dont TG), surface cutanée élevée et score de sévérité du psoriasis

Gladman DD et al. Ann Rheum Dis 2009; 68: 1131-5

*Tam LS et al. Arthritis Care and Research 2008; 59: 1322-31

Arthrite psoriasique

Intima-media sans ou avec facteurs de risque CV

Arthrite psoriasique

Ampleur du risque de MCAS: méta-analyse

Cohort studies

Cross-sectional studies

Spondylite ankylosante

Conséquences cardio-vasculaires

- ◆ Risque morbidité CV augmenté
- ◆ Mortalité vasc. augmentée X 1.4 ♂ mais X 1.2 ♀ ns*
- ◆ Combinaison de l'inflammation et d'une prévalence augmentée de facteurs de risque conventionnels
- ◆ Certains médicaments peuvent contribuer au risque CV

Mathieu S et al. Joint Bone Spine 2010; 77: 542-5

Vinsonneau U et al. Joint Bone Spine 2008; 75: 18-21

*Haroon NN et al. AIM 2015; 163: 409-16

Spondylite ankylosante

Survie cardio et cérébro-vasculaire

Spondylite ankylosante

Survie vasculaire: ASO périph., statines et AINS

Toute cohorte

Cohorte après 65 ans

Sclérodermie

Conséquences cardio-vasculaires

- ◆ RR de MCAS 1.8*
- ◆ Mécanisme différent: atteint endothélium et diffusion O₂
- ◆ Inflammation en résulte: CRP, homocystéine
- ◆ Rigidité vasculaire
- ◆ Mesures d'évaluation de la fonction endothéliale?

*Ungprasert P et al. Clin Rheum 2014; 33: 1099-1104

Sclérodermie

Conséquences cardio-vasculaires

Time after MI Diagnosis	HR (95% CI)	Stroke HR (95% CI)	CVD HR (95% CI)
<1 y	8.95 (5.43-14.74)	5.25 (2.90-9.53)	6.81 (4.55-10.20)
<2 y	6.20 (4.10-9.38)	4.57 (2.75-7.59)	5.00 (3.55-7.05)
<3 y	6.35 (4.45-9.07)	3.60 (2.26-5.74)	4.61 (3.41-6.22)
<4 y	5.55 (3.98-7.74)	3.21 (2.08-4.95)	4.18 (3.16-5.53)
<5 y	5.20 (3.77-7.18)	3.29 (2.18-4.95)	4.00 (3.05-5.24)

Syndrome anti-phospholipides

Conséquences cardio-vasculaires

- ◆ Risque d'ASO augmenté ne s'expliquant pas par les facteurs de risque traditionnels †
- ◆ RR de Plaques carot / fémorales X 4.3 pour APS et LED*
- ◆ Intima-media non augmentée !*
- ◆ Ac APL directement pro-inflammatoires et pro-thrombogéniques
- ◆ Interaction possible avec LDL-ox

†Amaya-Amaya J et al. Lupus 2014; 23: 1288-91

*Vlachoyiannopoulos PG et al. Rheumatology 2003; 42: 645-651

Vasculites

Conséquences cardio-vasculaires

- ◆ Artérite à cellules géantes, Takayasu, Polyartérite noueuse et Vasculites ANCA: **ASO accélérée**
- ◆ Documentation bien moins claire même si l'inflammation vasculaire peut théoriquement agir sur l'ASO

Maladies inflammatoires intestinales

Conséquences cardio-vasculaires

Liens controversés pour ASO (vs clairs pour TEV)

- ◆ Les colites inflammatoires ont moins de facteurs de risque traditionnels (ie. Score Framingham plus bas)
- ◆ Malgré cela, plus de MCAS ?
- ◆ Intima-media augmentée, dysfonction endothéliale et DLP
- ◆ Risque non ajusté IM: jusqu'à X 3 ? (selon activité colite*)
- ◆ Risque ajusté pour obésité, HTA, diabète et DLP: jusqu'à X 4 ?
 - ➔ Neutrophilie est ici un facteur de risque non traditionnel

Yarur AJ et al. Am J Gastroenterology 2011; 741-7

*Ruisi P et al. J Clin Med Res 2015; 7: 257-61

Dorn SD, Sandler RS. Am J Gastroenterol 2007; 102: 662-7

Andersen NN, Jess T. World J Gastrointest Pathophysiol 2014; 5: 359-65

Maladies inflammatoires intestinales

Conséquences cardio-vasculaires

Meilleure revue sur TEV, ASO, MCAS, AVC, Isch. Intestinale, mortalité CV, facteurs de risque, Tx préventifs dont Inh. TNF- α

*World Journal of
Gastrointestinal Pathophysiology*

Online Submissions: <http://www.wjgnet.com/esps/>
Help Desk: <http://www.wjgnet.com/esps/helpdesk.aspx>
DOI: 10.4291/wjgp.v5.i3.359

World J Gastrointest Pathophysiol 2014 August 15; 5(3): 359-365
ISSN 2150-5330 (online)
© 2014 Baishideng Publishing Group Inc. All rights reserved.

MINIREVIEWS

Risk of cardiovascular disease in inflammatory bowel disease

Andersen NN, Jess T. *World J Gastrointest Pathophysiol* 2014; 5: 359-65

PAR et thérapies biologiques

Avant la maladie, pendant puis avec Rx biologique

Evaluation pratique du risque CV en 2017

Éléments à considérer en plus du score CV clinique

◆ Marqueurs sub-cliniques

- ➔ Plaques d'ASO
- ➔ Intima-media carotidienne
- ➔ Score calcique
- ➔ ITH: index tibio-huméral
- ➔ Micro-albuminurie

◆ Marqueurs sérologiques

- ➔ Apo B- Lp(a)
- ➔ hsCRP
- ➔ Sédimentation
- ➔ Insulinemia
- ➔ Homocysteine

Ultrasonographie carotidienne

Évaluation de l'ASO et stratification du risque CV

- ◆ Épaisseur Intima-Media
 - ➔ Intima-media thickness: "IMT"
- ◆ Épaisseur de plaque
- ◆ Surface de plaque
- ◆ Volume de plaque
- ◆ Sténose
- ◆ Type de plaque:
 - ➔ Échogénicité
 - ➔ Homogénéité

- ◆ Faible coût
- ◆ Accessible
- ◆ Non-invasive
- ◆ Quantitative
- ◆ Reproductible
- ◆ Mesure l'ASO intimale avant la sténose angiographique

Échographie carotidienne: endroits étudiés

Méthodologie différente d'une étude à l'autre

The Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study

Valeur prédictive de l'IMT par strate

Hypertension	2.1
Diabetes	2.5
Current smoking	1.3

CIMT (mean of CCA-Bulb-ICA)
increased hazard rate ratio (HRR) vs CIMT < 0.6 mm

CIMT	CHD		Stroke	
	Men	Women	Men	Women
> 1.0 mm (Yes/No)	1.20	2.62	1.78	2.02
> 1.0 mm	2.15	7.40	2.59	4.32
0.80 - 0.99 mm	2.44	3.35	2.08	3.14
0.70 - 0.79 mm	1.56	3.56	1.26	1.73
0.60 - 0.69 mm	1.21	2.53	0.79	2.07

Chambless LE & al. Am J Epidemiol 1997. 146:483-494

Chambless LE & al. Am J Epidemiol 2000. 151:478-487

Valeurs de référence pour Intima-media (75^{ème} percentile)

Score calcique: le principe sous-jacent

Score calcique

Le score Agatston et le risque CV

Lignes directrices pour interprétation du score calcique

Score calcique	Fardeau athéromateux	Probabilité maladie coronarienne significative	Évaluation globale risque maladie cardiovasculaire
0	Pas de plaque décelable	Très bas (<5%)	Très faible
1-10	Fardeau minime	Peu probable (<10%)	Faible = 10%
11-100	Fardeau léger	Léger	Modéré 10 à 19%
101-400	Fardeau modéré	Probabilité modérée à élevée de maladie coronarienne non obstructive	Elevé = 20%
>400	Fardeau sévère	Probabilité élevée d'une (ou plus) lésion obstructive	Très élevé > 20%

Sur 5 ans

Hoff et al, JACC 2003; 41: 1008-1012

Rumberger et al, Mayo Clin Proc 1999; 74: 243-252

McPherson et al, Can J Cardiol 2006; 22: 913-927

Score calcique et événements cardiaques

Valeur additive au score de Framingham

Score calcique 2017 Raffinement

Seul score
vraiment utile = 0,
ce qui n'exclut
pas MCAS dans
4% des cas, donc
VPN 96%

Blaha MJ et al. JACC 2017
10: 923-37

BEYOND THE AGATSTON SCORE: THE BIOMARKER APPROACH

BEYOND THE AGATSTON SCORE: THE NEW SCORE APPROACH

Score calcique

Recommandations CCS 2016

Quand le demander et ne pas le demander

1. We suggest that CAC screening by CT may be appropriate for asymptomatic, middle-aged adults (FRS 10-20%) where treatment decisions are uncertain.

(Conditional Recommendation, Moderate Quality Evidence)

2. We suggest that CAC screening by CT not be undertaken for a) high risk individuals

b) patients on statin treatment or c) most asymptomatic, low-risk adults. (*Strong*

recommendation, moderate quality evidence)

Score calcique

Recommandations CCS 2016

Patients à faible risque et avertissement

3. We suggest that CAC screening might be considered for a subset of low-risk middle aged individuals with a family history of premature CHD (male <55 years; female <65 years). *(Conditional recommendation, low quality evidence)*
4. We suggest that in patients warranting risk factor management based on usual criteria, CAC scoring not be undertaken. Moreover, CAC scoring (seeking a result with a value of zero) should not be used as a rationale for withholding otherwise indicated, preventive therapies. *(Strong recommendation, Low Quality Evidence)*

Risque CV

Selon certains marqueurs sérologiques

Relative Risk of Future CV Events

Facteurs de risque CV

Women's Health Study

Relative Risk of Future Cardiovascular Events

hs-CRP

Valeur additive au score de Framingham

PAR – EULAR 2015

Synopsis des recommandations

- ◆ **Pas de score CV validé spécifique pour PAR**
- ◆ **L'échographie, non nécessaire pour instituer des biologiques, pourrait améliorer la stratification mais il y a des considérations pratiques.**
- ◆ **Les statines sont au moins aussi efficaces dans la PAR que sans PAR et compatibles avec rituximab**

PAR – EULAR 2015

Synopsis des recommandations

- ◆ L'exercice doit être encouragé pour la PAR et la prévention CV
- ◆ Évidences pour Arthrite psoriasique et SA similaires à PAR. Contôler l'activité de la maladie peut réduire le risque CV. L'activité de la maladie compte plus que la durée.
- ◆ Il n'y a pas pour la PAR d'association forte entre AINS et risque CV. L'AAS n'est pas recommandée en prévention primaire

Dépistage des dyslipidémies et maladies inflammatoires

Recommandations CCS 2016

Men $\geq$ 40 years of age, and women $\geq$ 50 years of age or postmenopausal
(consider earlier in ethnic groups at increased risk such as South Asians or First Nations individuals)

or

All patients with any of the following conditions, regardless of age:

- Current cigarette smoking
- Diabetes
- Arterial hypertension
- Family history of premature CVD
- Family history of hyperlipidemia
- Erectile dysfunction
- Chronic kidney disease

- Inflammatory disease
- HIV infection
- Chronic obstructive pulmonary disease
- Clinical evidence of atherosclerosis or abdominal aneurysm
- Clinical manifestation of hyperlipidemia
- Obesity (body mass index $>$ 27)

Adults with the following risk factors should also be screened at any age: **RA, SLE, psoriatic arthritis, ankylosing spondylitis, IBD, COPD, chronic HIV infection, CKD, AAA and ED**

Prévention primaire

Cas clinique d'une arthrite psoriasique

- ◆ Patiente de 50 ans, grande sportive, connue pour arthrite psoriasique ne répondant pas au methotrexate, mise sous Etanercept. Pas de stéroïdes POS
- ◆ Traitée aussi pour HTA avec irbesartan 300 mg
- ◆ HbA1c 0.5, HDL-C 1.8, LDL-C 3.5
- ◆ Inquiète car père fumeur IM 45 ans, dcd 70 ans et soeur ASO périphérique 50 ans, dcd 62 ans cancer poumon

- ◆ Est-ce que son risque CV est élevé? **OUI**
- ◆ Que suggérer? **STATINE, surtout si Plaque ou Intima-Media ↑**

Prévention primaire

Cas clinique d'une colite ulcéreuse

- ◆ Patiente de 50 ans, CU, connue pour EP à 25 ans
- ◆ Contrôlée avec mesalamine. A cessé l'anticoagulation.
- ◆ Aucun facteur de risque CV
- ◆ Inquiète car a lu que les maladies inflammatoires augmentent le risque d'infarctus

- ◆ Est-ce que son risque CV est élevé? **Peut-être pas**
 - ◆ Que suggérer? **Saines habitudes de vie**

Merci